

BUTIREX C4™

(BUTIRATO SÓDICO, PROTEGIDO)

COMPOSICIÓN

Promotor de crecimiento natural (no antibiótico) y modulador de la flora intestinal
Para que el butirato sódico pueda desarrollar sus acciones principales, tiene que encontrarse en forma no disociada en el intestino.
El BUTIREX C4, es desarrollado con un método de fabricación específico que nos permite producir un butirato sódico que llegue en forma no disociada al intestino.
Contiene: Butirato de Sodio al 54% (Estabilizado).

BENEFICIOS

- En la Micro Flora Intestinal, favorece desarrollo de acidófilos (*Lactobacillus* y *bifidobacterias*), controlando el crecimiento de patógenos entéricos (*E. coli*, *Salmonella ssp.* y *Clostridium ssp*)
- En la Velloosidades, incrementa el tramo de la velloosidad (30%), Integridad de la mucosa intestinal e Incremento de la superficie de absorción.
- En el Páncreas, induce estimulación Endocrina (Insulina, Glucagon y Somastotatina) y Exocrina (Amilasa, Proteasa y Lipasa)
- En el Intestino Delgado, Estimulación de enzimas intestinales (Lactasa, Sucrasa y Maltasa) (40%)
- Como fuente de energía directa para los enterocitos
- Acción de atracción del consumo, recuerda al joven mamífero el olor de la leche materna, incitándole a consumir.
- Aumento del porcentaje de huevo y calidad de la cascara en ponedoras.

USO

Mezclado en alimento

DOSIS

- ✓ BROILER
 - Inicio: 1.0 a 2.0 Kg/tn alimento
 - Engorde: 1.0 a 1.5 Kg/tn alimento
 - Acabado: 0.5 a 1.0 Kg/tn alimento
- ✓ PONEDORAS
 - Levante: 1.0 Kg/tn alimento
 - De semana 16 al pico de producción (Semana 25 ó 30): 2.0 Kg/tn alimento
 - Al final de puesta (Semana 50): 2.0 Kg/tn alimento
- ✓ PORCINOS
 - Lechones: 3.0 a 5.0 Kg/tn alimento
 - Engorde: 1.0 a 2.0 Kg/tn alimento
 - Marranas: 2.0 a 3.0 Kg/tn alimento

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg

PRECAUCIONES

Almacene en lugares frescos y secos.